

各種作物の種子消毒、ゴルフ場の病害管理に！！

# ベノレート<sup>®</sup>T 水和剤20



農林水産省登録	20888号
有効成分	ベノミル … 20% / チウラム … 20%
毒性	普通物（毒劇物に該当しないものを指している通称）
規格	1kg × 12袋

## 特長

- 1.ベノミルの浸透移行性とチウラムの保護殺菌力で安定した効果を発揮する
- 2.抗菌スペクトラムが広い
- 3.薬害の心配が少ない

## 適用内容(抜粋) (2025年3月 現在)

作物名	適用病害名	希釈 倍数	使用 時期	本剤の 使用回数	使用方法	チウラムを 含む農薬の 総使用回数	ベノミルを 含む農薬の 総使用回数
日本芝 (こうらいしば)	葉腐病 (ラージパッチ) ヘルミントスポリウム葉枯病	1000倍	発生 初期	6回以内	1m <sup>2</sup> 当たり 1~2g 散布	8回以内	8回以内
西洋芝 (ベントグラス)	葉腐病 (ブラウンパッチ) ヘルミントスポリウム葉枯病						
西洋芝 (パーミュエダグラス)	ヘルミントスポリウム葉枯病						

作物名	適用病害名	希釈倍数または使用量	使用 時期	本剤の 使用回数	使用 方法	チウラムを 含む農薬の 総使用回数	ベノミルを 含む農薬の 総使用回数
豆類(種実)	フザリウム・リゾ クトニア菌に よる病害	乾燥種子重量の 0.2~0.5%	は種前	1回	種子処理機に よる 種子粉衣	1回	1回
野菜類		乾燥種子重量の 0.4~0.5%					
花き類・ 観葉植物		乾燥種子重量の0.5%					

上記の他、稲、麦類、さといも、だいず、やまのいも、トマト、きゅうり、かぼちゃ、すいかなどの種子(または種いも)消毒や、ぶどう(休眠期散布)など、多くの作物に対する登録があります。

## 使用上の注意事項

### 安全使用上の注意

- ・ 薬液の調整は少量の水で糊状にし、所定量の水を加え、よく攪拌する。
- ・ 眼に入った場合は直ちに水洗いし、眼科医の手当てを受ける(強い刺激性)。
- ・ 皮膚に付着しないように注意する。皮膚についた場合は直ちに石鹸でよく洗い落とす(刺激性)。
- ・ かぶれやすい人は取扱いに十分注意する。
- ・ 誤って飲み込んだ場合は吐き出させ、直ちに医師の手当てを受けさせる。
- ・ **魚毒性…水産動物に強い影響を及ぼすので、河川、湖沼、海域及び養殖池に飛散・流入する恐れがある場所では使用しない。**
- ・ 散布器具・容器の洗浄水及び残液は、河川等に流さず、周囲の影響のない地点を選定し、土壌表面に散布する等の処理を行い、容器・空袋等は水産動物に影響を与えないよう適切に処理する。

### 保管

- ・ 密封して、直射日光をさけ、食品と区別して、冷涼、乾燥した場所に置く。

・ 使用前にラベルをよく読んでください。・ ラベルの記載内容以外には使用しないでください。・ 小児の手の届く所に置かないでください。