

各種作物の種子消毒、芝のブラウンパッチに!!

ホクサン テウラム80



農林水産省登録	22687号(ホクサン株式会社登録)
有効成分	テウラム・・・80.0%
物理的・化学的性状	淡青緑色水和性粉末 45 μ m以下
毒性	普通物(毒劇物に該当しないものを指していう通称)
規格	1kg $\times$ 20

特長

1. 種々作物の種子消毒剤として、幅広い登録を有します。
2. 芝に対して、ブランパッチ他の病害に効果を示す。
3. 抗菌スペクトラムが広い。

登録内容 (2025年4月1日現在)

作物名	適用病害虫名	希釈倍数又は 使用量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	テウラムを 含む農薬の 総使用回数
芝	葉腐病(ブラウンパッチ)等諸病害	250倍	発病初期	8回以内	1㎡当たり0.16～0.22L 散布	8回以内
豆類(種実)、 豆類(未成熟)、 てんさい、たばこ	立枯病	2～5g/種子1kg	は種前	1回	種子粉衣	1回
針葉樹	立枯病	2～5g/種子1kg	は種前	-	種子粉衣	-
れんげ	菌核病	5～10g/種子1kg	は種前	1回	種子粉衣	1回
稲	いもち病、ごま葉枯病	2～5g/種子1kg	は種前	1回	種子粉衣	1回
野菜類、豆類(種実)	フザリウム・リゾクトニア菌による病害(立枯病等)	2～5g/種子1kg	は種前	1回	種子処理機による 種子粉衣	1回
未成熟とうもろこし	苗立枯病	5g/種子1kg	は種前	1回	種子処理機による 種子粉衣	2回以内
飼料作物	フザリウム・リゾクトニア菌による病害(立枯病等)	2～5g/種子1kg	は種前	1回	種子処理機による 種子粉衣	1回
花き類	フザリウム・リゾクトニア菌による病害(苗立枯病、萎黄病、立枯病等)	5g/種子1kg	は種前	1回	種子処理機による 種子粉衣	1回
りんご	黒点病	1000～1500倍	収穫60日 前まで	5回以内	散布	5回以内

使用上の注意事項

安全使用上の注意

●誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、直ちに医師の手当を受ける。●眼に強い刺激性があるので眼に入らないよう注意する。眼に入った場合は十分に水洗し、眼科医の手当を受ける。●皮膚に刺激性があるので皮膚に付着しないよう注意し、付着した場合は直ちに石けん洗い落とす。●使用の際は保護眼鏡、防護マスク、不浸透性手袋、不浸透性防除衣などを着用する。●作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯する。●本剤で処理した種子は食料や動物飼料として用いない。

魚毒性

●水産動植物(魚類)に強い影響を及ぼす恐れがあるので、河川、湖沼及び海域等に飛散、流入しないようにする。●養殖池周辺での使用は避ける。●水産動植物(甲殻類、藻類)に影響を及ぼす恐れがあるので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう使用する。●薬液が残らないように調製し、使いきる。●散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さない。空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理する。

●使用前にラベルをよく読んでください。●ラベルの記載内容以外には使用しないでください。●小児の手の届く所に置かないでください。